


Liste officielle des affections
pathologiques reconnue par l'
Académie des Sciences



Intoxication alimentaire

L'intoxication alimentaire est une affliction bénigne qui touche nos compatriotes abusant de la bonne chaire. Invariablement, des douleurs abdominales et des nausées sont les signes distinctifs de cette intoxication. Un professionnel de la santé reconnaîtra également l'oeil vitreux du patient. Le reste des fonctions vitales est parfaitement normal. Les symptômes durent de 3 à 5 jours. Les médicaments classiques comme le Socalban et le Politran peuvent immédiatement soulager le souffrant durant une heure. Il conviendra donc de renouveler les prises autant que nécessaire. Pour un traitement de fond, un comprimé de Grinofal est la solution. 1 heure après la prise, tous les symptômes disparaissent définitivement. Un bon praticien recommandera tout de même à son patient de consommer les mets gras et alcoolisés avec modération, sous peine de rechute !

Intoxication aux gaz irritants

L'industrie moderne a amené son cortège de risques et de désagréments. C'est le prix à payer pour profiter du confort moderne dans nos foyers grâce à toutes les productions de nos chères usines. L'un de ces risques est lié aux gaz issus des processus chimiques mis en œuvre dans les centres de production. Les effets visibles sont variés et digères suivant le sexe, la race, l'âge ou le poids de l'individu. Ce la peut être une composition des symptômes suivants : Toux, sanglante ou douloureuse, des vertiges, des nausées, des migraines légères ou fortes et parfois de la fatigue. Une chose est par contre immuable : les intoxication au gaz irritant provoquent la contraction de la pupille et des palpitation cardiaque. (Pas de variation au niveau de la température et des réflexes). Les effets d'une contamination durent 48 heures. Tous les symptômes peuvent être calmés à l'aide de médicaments classiques mais une séance d'inhalation d'Irtolax (5 minutes) calme définitivement les effets d'un intoxication aux gaz irritants. Il est à noter que l'Irtolax peut être utilisé à titre préventif. I est fréquemment utilisé dans les masques de protection de nos travailleurs et chimistes.

La grippe commune

La grippe commune est, comme son nom l'indique, une maladie relativement banale en Bravenne. Il est rare de passer un hiver sans la contracter. Elle est caractérisée par une toux légère et la fameuse raideur dans la nuque bien connue des Bravais et Bravaises. Fort heureusement, une gélule de Gargantax soignera définitivement la maladie en 10 minutes. Sinon, un comprimé de Topamine calmera efficacement la toux pendant 1 heure. Il arrive parfois que le ou la patiente se plaignent de migraines pouvant être légères ou fortes. Dans ce cas, un cachet de Surifine calmera la crise durant 1 heure. il faudra en suite reprendre une gélule. Une fièvre d'environ 39° est caractéristique de la maladie. Le patient a l'oeil vitreux. Le coeur et les reflexes ne sont pas impactés. Enfin, il n'est pas rare, mais pas obligatoire, qu'une fatigue soit ressentie au cours de l'épisode.

La Peste Maritime

La Peste Maritime est une maladie qui atteint souvent les marins embarqués en particuliers lorsqu'ils passent de longs séjours en mer. Mais le caractère contagieux de la maladie fait que bon nombre de « terriens » en sont victime. C'est une maladie évolutive et l'on peut distinguer 3 phases : Phase 1 : Incubation/toux légère, Phase 2 : Crise, et la phase 3, la mort.

En phase 1, Une légère température apparaît (environ 39°) qui passe à plus de 41 en phase 2. Les réflexes, pourtant normaux en phase 1 se ralentissent en phase 2. Les pupilles sont invariablement dilatées tout au long de la maladie. C'est le rythme cardiaque le véritable signe d'un passage de phase de la maladie, en passant de rapide au début, à lent en phase 2 pour s'arrêter en phase 3.

Le patient ressent divers symptômes qui sont variables d'un individu à l'autre : En phase 1, c'est la toux légère qui domine, associé à une raideur dans la nuque. On peut ensuite trouver parfois des migraines légères ou fortes, ainsi que parfois une fatigue anormale du patient. En phase 2, la toux se transforme en toux sanglante ou douloureuse la raideur à la nuque est toujours présente et cette fois ci, le patient ressent de fortes migraines et une forte fatigue.

Le traitement de cette maladie est assez simple à condition qu'elle soit diagnostiquée tôt. En effet en phase 1, un simple comprimé de Toximal vous soignera en 1 heure. Bien entendu, tous les symptômes simples peuvent être soulagés grâce à des médicaments communs (Topamine, Surifine, Fonatgex...)

En cas de stade 2, il faut recourir à un médicament bien plus puissant : Une injection d'Ectiflon soigne la maladie. Tous les symptômes disparaissent en 1 heure sauf la fatigue, qui reste pendant 3 jours . Il est à noter que ce médicament provoque des effets secondaires non négligeables : Excitation anormale et bien être pendant 1 heure. Ce produit est toxique à haute dose, et provoque l'accoutumance.

La Pneumocotèque

La Pneumocotèque est une maladie grave et évolutive. Elle fait des ravages dans les milieux défavorisés ne bénéficiant pas de la présence de médecins. C'est une maladie évolutive conduisant à la mort. Son traitement est pourtant aisé et peu onéreux si il est pris à temps lors du premier stade de la maladie. En effet, une dose de Trekmine en injection intraveineuse suffit à s'en débarrasser. Si le stade 2 est atteint, il faut alors recourir au grand remède : le Sopranol. Ce médicament est redoutablement efficace, mais son coût de production le rends inaccessible à beaucoup de bourses. Il est produit à partir de plantes rares des Iles qui doivent encore subir de longues et savantes transformations chimiques. Le principal symptôme de la maladie, quelque soit le stade est la toux sanglante qu'elle provoque. Ces toux sont accompagnées, sans que cela soit une règle, de raideur à la nuque, de migraines fortes ou légères et parfois de fatigue. Les constantes médicales sont par contre très différenciées en fonction des stades de la maladie : au stade 1, Il n'y a pas de température, les réflexes sont normaux. L'oeil, lui aussi présente un aspect normal. Par contre, le coeur bat plus lentement. Au stade 2, il y a une forte fièvre, plus de 41, les réflexes s'en trouvent mous l'oeil passe à vitreux et on peut déceler la présence de palpitations cardiaques.

Hystérie Méningique

L'hystérie Méningique est un mal curieux qui a été mis en évidence il y a peu grâce aux recherches des savants de l'université de Revapp. Cette maladie peu commune se traduit par une propension plus ou moins forte à délirer. Le patient tient alors des propos incohérents. Il est agité. Il peut alors avoir des penchants paranoïaques, ou même être victime d'hallucinations. De temps en temps, les malades rapportent la survenue de légères migraines. Niveau physiologiques, un examen poussé mettra en évidence la présence de pupilles dilatées, une fréquence cardiaque rapide, de vifs réflexes et d'une légère température (environ 39). Le traitement est simple : du Somnamax. Une gélule suffit.

Podolus Disgutus (ou l'Arpion »)

Tout praticien vous le dira, il est des maladies dont on ne parle que dans le secret des cabinets et dont bien peu de bonnes gens reconnaissent en souffrir, et à juste titre. Le Podolus Disgutus est une affection cutanée n'atteignant que les pieds. Il est fort peu évident de déceler cette maladie car elle ne laisse que peu de trace visible sur les pieds, hormis lors de sa phase finale, qui signifie une mort certaine. Par contre, on peut facilement déceler des réflexes mous et un oeil vitreux. La température corporelle et le rythme cardiaque ne présentent pas d'anomalies. Les principaux symptômes de cette honteuse maladie sont les délires, parfois accompagnés de nausées ou de vertiges. Cette maladie se transmet exclusivement par contacts de chaussure à chaussure. Elle se propage dans les milieux libertins où l'échange de partenaire est une détestable mode. Un cachet de Rébulan soigne cette affliction mais le ou la patiente reste contagieux jusqu'à la disparition définitive des symptômes : 1 heure. Il conviendra de mettre au feu chaussures et autres chaussettes sous peine de recontamination. Enfin, le praticien se devra d'être prudent et d'avoir une hygiène parfaite pour ne pas être lui-même victime de cette triste maladie.

Hyperoidie

L'hyperoidie est une maladie très contagieuse, mais heureusement assez bénigne. Une injection de Rébulan pourra soigner le malade et stopper ainsi la propagation en moins d'une heure. En l'absence de cette injection, de simples médicaments pourront atténuer les symptômes qui sont, outre une forte fièvre (plus de 41) des réflexes vifs, un pupille contractée et un coeur rapide, des migraines légères. Il arrive parfois que certain patients délirent, ou soient victime de nausées et de vertiges.

Gromélose

La Gromélose est une maladie gastrique relativement fréquente en Bravenne. Elle se caractérise par des nausées et des douleurs abdominales. C'est souvent un manque d'hygiène des cuisiniers et cuisinières qui, en omettant de bien laver leurs mains, transmettent cette maladie. Elle se guérit spontanément en 3 jours et de nombreux médicaments permettent d'atténuer les symptômes. Pour les plus fortunés, une injection de Borabian vous débarrassera en moins d'une heure de ces désagréables symptômes. Un coeur ralenti, une pupille dilatée, une température à 39 et des reflexes mous sont autant de signes qu'un bon professionnel saura reconnaître pour diagnostiquer cette maladie.